



Komunikat sadowniczy SKS VIII 2014-04-22

PARCHA JABŁONI

Opady, które wystąpiły w święta wywołały średnie do silnych infekcji parcha jabłoni w całym regionie.

Zabieg zapobiegawczy wykonany w piątek/sobotę powinien w pełni uchronić przed tą infekcją. W sadach w których zabieg wykonano wcześniej, bądź są wątpliwości co do poprawności wykonania ostatniego zabiegu należy wykonać zabieg interwencyjny preparatem **Matute 250EC** lub Score 250EC, w mieszaninie z preparatem Delan 0,5 kg/ha. W niższych temperaturach należy zastosować Mythos, Chorus lub Qualy. Polecamy również gotowe mieszaniny takie jak **Vision, FlintPlus, Tercel**.

2-3 l/ha preparatu fosforynowego np. **Prevent P** wykazuje silne działanie wyniszczające zarodniki parcha jabłoni jak również innych grzybów. Nawozy fosforynowe zalecamy stosować jako dodatek do zabiegów zapobiegawczych.

ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE

Do kwitnienia zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego zwójkówki liściowe, szczególnie w sadach, w których były problemy w ubiegłym sezonie. Preparaty: Sherpa 100EC, Affirm 095SG, Coragen 200SC lub Runner 240SC.

SZARA PLEŚŃ W GRUSZY

Sady gruszowe są w pełni kwitnienia, dlatego zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego szarą pleśń preparatem Switch 62,5WG

ZARAZA OGNIOWA

Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja rozwojowi sprawcy zarazy ogniowej, dlatego w sadach gruszowych oraz we wszystkich które w ubiegłym roku były porażone przez tę chorobę, bądź w sąsiedztwie wystąpiła silna presja ze strony zarazy ogniowej zalecamy opryskiwanie w trakcie kwitnienia preparatami miedziowymi (np. Miedzian 50 WP w dawce 1,5 kg/ha).

NAWOŻENIE DOLISTNE SADÓW

Nawóz **FruitAkademia na Różowy pąk** - ma optymalny skład potrzebny do wzmocnienia pąków i liści przed kwitnieniem

W sadach wiśniowych, które jeszcze się nie rozkwitły zalecamy nawożenie dolistne nawozami bogatymi w azot, bor i cynk, np. **FruitAkademia na Zielony pąk**. W sadach kwitnących nawożenie dolistne należy wstrzymać na okres kwitnienia

Do cieczy użytkowej warto również dodać preparat aminokwasowy (np. Megafol).

NanoActive Forte – do zastosowania przed kwitnieniem Nawóz ten wzmocni rozety kwiatowe, co korzystnie wpłynie na późniejszą jakość zawiązków i liści.

OGRANICZENIE SIŁY WZROSTU DRZEW

Na niektórych odmianach jest już wykształcone 4-6 liści w rozetach na końcach jednorocznych pędów, jest to optymalny termin do stosowania Regalisu. Dawka powinna być uzależniona od siły wzrostu drzew. Podzielenie dawki i wykonanie 2-3 aplikacji daje lepsze rezultaty.