

*System Komunikatów Sadowniczych – **SKS** – zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Bełsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowiec, Tarczyn, Warka, Wilga.***



## **Komunikat sadowniczy SKS XIII 2014-05-13**

### **GRADOBICIE**

Na terenie grójecko – wareckim wystąpiły lokalne gradobicia. Prognozy pogody wskazują, że gradobicia mogą występować w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Najskuteczniejszymi preparatami zabezpieczającymi uszkodzone tkanki roślinne są preparaty zawierające kaptan oraz preparat Topsin. W przypadku wystąpienia gradobicia zalecamy wykonać zabieg (możliwie jak najszybciej po gradobicu) z użyciem jednego z podanych preparatów:

**Kaptan 50 WP** w dawce 3 kg/ha

**Captan 80 WG** w dawce 1,9 kg/ha

**Topsin M 500 SC** w dawce 1,5 l/ha

Do pierwszego zabiegu po gradobicu warto również dodać preparat fosforynowy (np. Prevent P w dawce 3-4 l/ha). Preparaty fosforynowe silnie ograniczają rozprzestrzenianie się patogenów występujących na ranach na korze drzew, liściach oraz zawiązkach.

Po gradobicach w poprzednich latach w wielu sadach stosowane były również preparaty zawierające aminokwasy roślinne z bardzo dobrymi efektami. Proponujemy do zabiegu fungicydowego dodać jeden z preparatów aminokwasowych w dawce 3-4 l/ha (np. **Megafol**).

Uwaga: stosowanie preparatu Topsin może skutkować pozostałościami substancji aktywnej preparatu w owocach.

Przez pierwszy tydzień po wystąpieniu gradobicia nie zalecamy stosować silnego dokarmiania dolistnego. Dopiero po okresie tygodnia należy powrócić do standardowego programu dokarmiania dolistnego.