



Komunikat sadowniczy SKS 2 2015-03-26

PARCH JABŁONI

W związku z prognozowanymi opadami w ciągu kilku najbliższych dni, może wystąpić pierwsze zagrożenie ze strony parcha jabłoni. W celu zabezpieczenia pąków wskazane jest wykonanie zabiegu prewencyjnego jednym z preparatów miedziowych np. **Miedzian 50 WP, Copper Max 50 WP** w dawce 1,5 kg/ha.

ZWALCZANIE PRZĘDZIORKÓW I MSZYC

W sadach w których stwierdzono obecność zimujących jaj przędziorków można wykonać zabieg olejem parafinowym (np. **Treol 770 EC** w dawce 10-15 l/ha). Zabiegi olejem mineralnym wykonane wczesną wiosną ograniczają również liczebność mszyc. Zabieg wykonany w terminie najpóźniej do fazy mysiego ucha niesie ze sobą dużą skuteczność i jest polecany wówczas gdy:

- nie przewiduje się wczesnowiosennego zwalczania mszycy jabłoniowej w sadzie,
- w poprzednich sezonach masowo występował przędziorek owocowiec lub pordzewiacz.

Zasady stosowania oleju parafinowego w obecnym terminie:

- nie stosować w mieszaniu z fungicydami (z wyjątkiem miedziowych),
- jeśli widoczne są już zielone tkanki **nie stosować w mieszaniu z produktami siarkowymi**,
- zachowywać odstęp pomiędzy zastosowaniem preparatu olejowego a fungicydami,
- nie stosować w okresie zagrożeń wystąpienia przymrozków.

NAWOŻENIE DOLISTNE

Drzewa owocowe w ciągu najbliższych kilku dni będą rozpoczynały pompowanie soków do górnych partii koron. W związku z tym, że ziemia jest jeszcze stosunkowo zimna, transport ten może być utrudniony. Proponujemy zastosować gotowy nawóz **FruitAkademia na początek wegetacji**. W sadach gdzie widoczne są zielone tkanki dawkę należy zmniejszyć do 5-7 kg/ha (standardowa dawka to 11 kg/ha).

RAK KORY, ZGORZEL KORY

Sady po formowaniu koron, zagrożone chorobami kory i drewna należy zabezpieczyć preparatem **Topsin M 500 SC** w dawce 1,5 l/ha.

ZWALCZANIE RAKA BAKTERYJNEGO DRZEW PESTKOWYCH

W okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych drzew pestkowych, należy wykonać zabieg przeciwko rakowi bakteryjnemu stosując jeden z produktów miedziowych, np. **Copper Max 50 WP** w dawce 1,5-3 kg/ha. Produkty miedziowe zapobiegają również zarazie ogniowej.

Uwaga: W sezonie 2015 streszczenie komunikatów SKS jest dostępne także jako SMS.

Komunikat SKS 2 2015:

Parch jabłoni zapobiegawczo Copper Max 1,5kg. Przędziorki i mszyce Treol 15L. Dolistnie nawóz FA_na_poczatek_vegetacji Choroby kory i drewna Topsin 1,5L Rak bakteryjny pestkowych CopperMax 3kg

http://zzowarka.pl/download/SKS_2_2015.pdf