



Komunikat sadowniczy SKS 8 2015-05-05

PARCH JABŁONI

Prognozowane na środę bardzo silne opady mogą przynieść najsilniejszą w tym sezonie infekcję parcha jabłoni. Przed deszczem zalecamy wykonanie oprysku zapobiegawczego preparatem **Delan 700 WG** 0,5kg/ha lub produktem opartym na kaptanie np. **Captan 80 WG** w dawce 1,9 kg/ha.

Przed bardzo silną infekcją zabieg powinien być wykonany łącznie z preparatem wspomagającym ochronę np. **Kendal 2,0 l/ha** lub **Prevent P 2,0 l/ha**.

Po bardzo silnej infekcji zalecamy wykonanie zabiegu interwencyjnego. W zależności od temperatury podczas zabiegu: **Batalion 450 SC 0,7 l/ha** lub **Score 250 SC 0,2 l/ha**. Preparaty interwencyjne należy stosować zawsze w mieszaninie z fungicydem kontaktowym (Delan/Captan).

MĄCZNIAK JABŁONI

Aktualne warunki pogodowe są optymalne dla rozwoju mączniaka jabłoni. Zalecamy wykonanie zabiegu ograniczającego z jednym z preparatów: **Zato 50WG**, **Kendo 50EW**, **Kaptan Plus 71,5WP**, **Fontelis 200SC**, **Flint Plus 64WG**, **Topas 100EC**.

SZARA PLEŚŃ

W sadach jabłoniowych w fazie pełni kwitnienia oraz w okresie opadania płatków kwiatowych zalecamy wykonać zabieg zwalczający szarą pleśń jednym z preparatów: **Mythos 300SC**, **Fontelis 200 SC** lub **Thiram Granuflo 80 WG**. Zabieg produktem Mythos 300SC należy wykonać w mieszaninie z jednym z preparatów kontaktowych (Delan/Captan).

NAWOŻENIE DOLISTNE

Na kwitnących odmianach jabłoni należy stosować nawozy bogate w azot, bor i mangan.

Polecamy gotowe rozwiązanie nawóz **FruitAkademia na kwitnienie**.

W związku z panującą suszą zalecamy dodanie do zabiegu produktu zawierającego aminokwasy roślinne **Megafol 2,5 l/ha**.

OGRANICZENIE SIŁY WZROSTU DRZEW

Na niektórych odmianach jest już wykształcone 4-6 liści w rozetach na końcach jednorocznych pędów, jest to optymalny termin do stosowania **Regalis 10WG**. Dawka powinna być uzależniona od siły wzrostu drzew. Podzielenie dawki i wykonanie 2-3 aplikacji po 0,75kg/ha daje lepsze rezultaty.

TRUSKAWKA

Truskawka wchodzi w fazę kwitnienia. Należy rozpocząć zwalczanie szarej pleśni. Zalecamy wykonanie zabiegu jednym z preparatów: **Luna Sensation 500SC**, **Mythos 300SC**, **Frupica 440SC**, lub **Signum 33WG**.

TRUSKAWKA NAWOŻENIE DOLISTNE

Warunki pogodowe: susza oraz lokalne wystąpienie przymrozków nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi truskawek. Zalecamy zastosowanie nawożenia dolistnego: **Plantafol 10.54.10** 2,5kg/ha + **Megafol 2,5l/ha**.

SKS 8 2015 Parch: zapobiegawczo: Delan 0,5kg+PreventP 2L interwencyjnie: Batalion 0,7L/Score 0,2L+Delan 0,5kg
Macznik: Zato 0,15kg Szara pleśń: Mythos 1,5L Dolistnie: FruitAkademia_ kwitnienie+Megafol 2,5L Truskawka:
szara pleśń: Mythos 1,5L Dolistnie: Plantafol 10.54.10 2,5kg+Megafol 2,5L.
http://zzowarka.pl/download/SKS_8_2015.pdf