



## **POZAKORZENIOWE DOKARMIANIE WAPNIEM**

Wapń jest jedną z najważniejszych substancji odżywczych wpływających na jakość i zdolność przechowalniczą owoców. W przypadku braku wapnia objawy są widoczne najczęściej na owocach, co w znacznym stopniu obniża ich wartość handlową i zdolność przechowalniczą. W wielu sadach na owocach już można zaobserwować pierwsze objawy gorzkiej plamistości podskórnej, dlatego należy szczególną troską otoczyć owoce, które są przeznaczone do długotrwałego przechowywania.



Objawy niedoboru wapnia na owocach jabłoni.

W celu poprawienia jakości owoców i zdolności przechowalniczych należy rozsądnie zaplanować nawożenie produktami wapniowymi. Poniżej znajduje się lista sprawdzonych nawozów z oferty ZZO Warka.

### **AMIWAP**

Wapniowy nawóz dolistny, w którym wapń jest skompleksowany aminokwasami. Bezpieczny w stosowaniu nawet w wysokich temperaturach. Dzięki aminokwasom wapń zawarty w nawozie jest bardzo łatwo i szybko przyswajalny przez rośliny.

**DAWKOWANIE 2,5 l/ha**

### **NANO ACTIVE**

Skutecznie i bardzo szybko dostarcza roślinom znacznie więcej substancji pokarmowych niż tradycyjne formułowane nawozy dolistne. Zawiera duże ilości wapnia, dzięki czemu korzystnie wpływa na zdolność przechowalniczą owoców.

**DAWKOWANIE 3kg/ha**

### **Chlorek wapnia + MEGAFOL**

Mieszanka polecana przy temperaturach przekraczających 20°C. MEGAFOL to wysokiej jakości aminokwasy roślinne, których dodatek zwiększa nie tylko wchłanianie wapnia, ale i ogranicza negatywne skutki stosowania chlorkowej formy wapnia.

**DAWKOWANIE Chlorek wapnia 10kg/ha + MEGAFOL 1l/ha**



W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z doradcami FruitAkademii:  
**Jarosław Kuklewski 501 097 057, Emil Szulc 518 188 855**